



新时代·新征程·新作为

中华护理学会全国呼吸护理新进展学术交流会

NS-Ä`£€ bat eHgœkÔ•f

[žšœ~ÄW(SÑu s†N f f>šØNŽ[ùqg~Äy]î_ g ~βçj[fa NIy P < 0 . 0 5y y ‹æ%oÁ^h 10

h 1 NS-Ä`£€ bat eHgœkÔ•f [nÿ %y]

~ÄR+	OSÑu	lg	!ag
!bg	g eH		
[žšœ~Äy n = 6 6y	4 5y 6 8 . 1 8y	1 9y 2 8 . 7 9y	2y 3 . 0 3y 0y 0y 6 4y 1 0 0
[ùqg~Äy n = 6 5y	2 2y 3 3 . 8 4y	3 6y 5 5 . 3 8y	1 0y 1 9 5 2 4y 5 8y 9 0 . 6



新时代·新征程·新作为

中华护理学会全国呼吸护理新进展学术交流会

注：与对照组相比，*： $\chi^2=6.771$ ， $P=0.009$ ； $\chi^2=1.463$ ， $P=0.226$ 。

结论：

本研究结果显示，对照组的发生率75.7%，实验组的发生率34.38%，实验组预防效果显著优于对照组($P < 0.05$)，其差异有统计学意义。集束化护理减少ICU大便失禁性皮炎的发生，具有良好的效果，值得临床推广应用。由此可见，责任护士尽早对患者进行护理干预，充分评估患者皮肤问题及全身营养状况，采取合理的个体化护理措施，能有效减少IAD的发生，减轻患者痛苦，提高护理质量。