



新时代·新征程·新作为

中华护理学会全国呼吸护理新进展学术交流会

初治肺结核患者出院后服药依从性及其影响因素

作者：赵君

所在工作单位/机构：太原市第四人民医院

目的：

了解初治肺结核患者出院后的服药依从性，结合影响因素探讨问题解决的有效方法，对保证治疗效果、减少耐多药结核发生具有重要意义。本研究通过对初治肺结核患者居家服药依从性的现况调查，分析多种因素的影响作用，为建立合理可行的个性化治疗指导，提高出院后服药依从性提供依据。

方法：

以便利抽样法选取来院复查的初治肺结核患者120例，采用Morisky问卷进行出院后服药依从性调查，并对服药依从性的影响因素进行多因素Logistic回归分析。

结果：

120例患者中，67例（55.8%）患者抗结核药物服用依从性好，28例（23.4%）患者服药依从性为中等，25例（20.8%）患者服药依从性差。单因素分析显示年龄、医疗付费方式、文化程度、家庭人均月收入、服药种类与依从性评分比较，差异均有统计学意义($P < 0.05$)；Logistic回归分析显示初治肺结核患者服药依从性与年龄及医疗付费方式呈负相关($P > 0.05$)，而与文化程度、家庭人均月收入和服药种类呈正相关($P < 0.05$)。见表1

表 1 影响初治患者出院后服药的多因素 Logistic 回归分析

变量	回归系数	标准误	Wald χ^2 值	OR 值	95%CI	P 值
年龄	0.087	0.076	1.296	1.091	(0.939, 1.267)	0.255
医疗付费方式	-0.033	0.096	0.119	0.968	(0.802, 1.167)	0.731
文化程度	-0.771	0.182	17.975	0.463	(0.324, 0.661)	<0.001
家庭人均月收入	0.571	0.096	35.475	1.771	(1.467, 2.137)	<0.001
服药种类	0.683	0.136	25.320	1.980	(1.517, 2.583)	<0.001

结论：

初治肺结核患者出院后服药依从性受多种因素的影响，医务人员应结合实际情况，充分考虑患者在住院和居家两个不同治疗阶段的生理、心理和社会需求，将专业指导与照护贯穿其中，以良好的服药依从性保证治疗效果，切实做好结核病防控工作。